


COVID-19 疫苗接種

注意事項看這邊



接種疫苗前



- 1 對疫苗成分有嚴重過敏反應史，或先前疫苗劑次發生嚴重過敏反應者，不可接種
- 2 不可與其他疫苗同時接種，或與其他廠牌交替使用
- 3 發燒或正患有急性中重度疾病者，請等到病情穩定後再接種
- 4 服用避孕藥或接受荷爾蒙治療者，請先暫緩接種
- 5 免疫功能低下者(含接受免疫抑制劑治療者)，免疫反應可能減弱



接種疫苗後



- 1 接種後於接種單位或附近休息30分鐘再離開
- 2 使用抗血小板/抗凝血藥物或凝血功能異常者，施打後請於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否有出血或血腫情形
- 3 接種後可能發生接種部位疼痛、紅腫，或是疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心等反應，通常輕微並於數天內消失
- 4 接種後可能有發燒反應($\geq 38^{\circ}\text{C}$)，約48小時可緩解，如持續發燒超過48小時或出現其他嚴重過敏反應，應儘速就醫，並告知醫師曾接種疫苗，同時請醫師通報
- 5 接種後14天內若有呼吸困難、胸/腹痛、四肢腫脹/冰冷、嚴重頭痛等不舒服症狀，應立即就醫

