

注意

M痘

你該這樣做

Mpox




⚠ 若前往M痘流行地區，避免與不特定人士親密接觸，如有疑似症狀請配戴口罩並立即就醫。


+ 症狀好發部位

+ M痘症狀

在臉部、四肢、肛門及生殖器附近，出現不同型態的皮膚病灶，如：皮疹、水泡、膿疱



+ 可能伴隨症狀



Acquired Immunodeficiency Syndrome

NO AIDS 定期
愛滋篩檢
掌握自身健康



珍愛自身

有「篩」真好!



有性行為：
建議至少
進行1次檢驗



有無套性行為：
建議每年
至少進行1次檢驗



♥ 感染性病
♥ 多重性伴侶
♥ 共用針具並使用
成癮性藥物

有感染風險行為：
建議每3至6
個月檢驗1次

潔身性愛 SAFE SEX
淋病不來
Don't Gonorrhea

傳染途徑及症狀大不同



- ① 性行為傳染
- ② 傷口接觸患者分泌物、血液
- ③ 新生兒經由母親感染

男性症狀 2-7天出現症狀

尿道化膿、排尿刺痛、
睪丸疼痛，偶爾可見於
直腸感染合併，肛門會
有搔癢感及分泌物流出。



女性症狀

出現尿道炎、
膀胱炎或子宮
頸炎的症狀。
頻尿、排尿灼痛、
或分泌物異味
增加、腹痛。




單純性福
遠離梅毒

Syphilis Out

避免多重性伴侶或與
性生活史不明之對象
發生性行為！

+ 第一期

梅毒螺旋體侵入人體約2~3週後



硬性下疳發生於梅毒螺旋體
的接觸部位。

如：陰莖、女性私密處及口腔

+ 第二期

出現硬性下疳的4~10週後



皮疹分佈於手掌與腳掌
為二期梅毒之特色，若
侵犯毛囊則會造成局部
毛髮脫落。

+ 第三期

5-30年後走向晚期



陰囊與肛門口
無痛性扁平濕疣。
又稱梅毒腫；亦可能
產生心臟血管性梅毒
侵犯主動脈。

梅毒與愛滋病毒
感染的傳播途徑
類似，利用HIV
篩檢以確認是否
合併感染。

如有懷疑自己感染淋病，
勿自行至藥局買藥或誤信偏方。
請儘速就醫，早期診斷、早期接受治療！